

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ECOGEL CUCARACHAS									
NUMERO DE REGISTRO INVIMA:	INVIMA 2021V-0000060									
NUMERO DE CONCEPTO TOXICOLOGICO:	ERIAP-CT-2020-0658									
FABRICANTE:	MYLVA S.A – Barcelona España									
IMPORTADOR COMERCIALIZADOR:	COMERVET S.A.									
DESCRIPCION:	ECOGEL es un cebo en gel insecticida para el control de cucarachas, el cual esta basado en una de formulación que proporciona al cebo una Delaying action© o Acción retardada©, que no permite que el insecto identifique el origen de su intoxicación. El resultado final es un control más completo y efectivo sin necesidad de alargar el tiempo de tratamiento.									
COMPOSICION:	Imidacloprid (s.a.).....2,15% Bitrex®..... 0,008% Excipientes y agua desmineralizada c.s.p.100%									
TIPO DE FORMULACIÓN:	GEL DE APLICACIÓN DIRECTA (GD)									
INDICACIONES:	Insecticida indicado contra: cucaracha alemana (<i>Blattella germánica</i>), cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>), cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>).									
DOSIFICACION Y MODO DE USO:	Aplicar el producto biocida solamente en huecos y hendiduras, detrás de muebles y máquinas. El producto no se puede utilizar sobre superficies accesibles. No lo aplique sobre madera o superficies porosas. Evite el contacto con las superficies tratadas. No exponga las gotas de cebo a la luz directa del sol o a fuentes de calor Aplicación en forma de gotitas mediante cartucho. Depende del nivel de infestación y de la especie de cucarachas (1 gota=0,04 g). <table><tr><td>Cucaracha alemana (<i>Blattella germánica</i>)</td><td>0.12-0.16g/m²</td><td>(3-4 gotas/m²)</td></tr><tr><td>Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)</td><td>0.16-0.24g/m²</td><td>(4-6 gotas/m²)</td></tr><tr><td>Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)</td><td>0.16-0.24g/m²</td><td>(4-6 gotas/m²)</td></tr></table>	Cucaracha alemana (<i>Blattella germánica</i>)	0.12-0.16g/m²	(3-4 gotas/m²)	Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0.16-0.24g/m²	(4-6 gotas/m²)	Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0.16-0.24g/m²	(4-6 gotas/m²)
Cucaracha alemana (<i>Blattella germánica</i>)	0.12-0.16g/m²	(3-4 gotas/m²)								
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0.16-0.24g/m²	(4-6 gotas/m²)								
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0.16-0.24g/m²	(4-6 gotas/m²)								

	Frecuencia de aplicación: 1 aplicación cada 4 semanas. Volver a aplicar una vez más si la infestación persiste. Frecuencia de tratamiento: 3 meses después de que la infestación termine, puede volverse a aplicar el tratamiento
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Puede producir una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoja el vertido. Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. La aplicación del producto ECOGEL CUCARACHAS habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No realizar la aplicación en presencia de personas y/o animales domésticos. No mezclar con otros productos químicos. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. Evítese el contacto con las superficies tratadas. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y / o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas con ECOGEL CUCARACHAS no contengan residuos de su principio activo.
CONSERVACION:	Almacenar en lugares bien ventilados preferentemente entre 5 y 45°C, siempre en los envases originales.
ADVERTENCIA:	NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS. I. ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS II. PUEDE MATAR ABEJAS Y POLINIZADORES III. NO APLICAR EN PRESENCIA DE ABEJAS O EN ÉPOCA DE FLORACIÓN DEL CULTIVO IV. NO APLICAR EN HORAS DE ALTA ACTIVIDAD DE ABEJAS V. CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS
VIDA UTIL:	24 meses
PRESENTACION:	Jeringas de Polietileno de baja densidad (PEBD) por 5gr y 35gr



Vía Augusta, 48 08006
Barcelona España
Tel. 34 934 153 226
mylva@mylva.eu - www.mylva.eu

MYLVA S.A.