





Descripción

PIRLAX es un insecticida y acaricida organofosforado con ingrediente activo **Pirimiphos Methyl**, de uso profesional en formulación concentrado emulsionable, indicado para el control de insectos en cualquier tipo de ambiente y el control de plagas propias de granos almacenados y la agroindustria. Su uso está indicado para programas estratégicos de mezcla y/o rotación con insecticidas piretroides.

ESPECIFICACIONES

Clase	Insecticida
Ingrediente Activo	Pirimiphos Methyl
Grupo Químico	Organofosforado
Formulación	Concentrado Emulsionable
Registro Sanitario Minsalud	RGSP - 317- 2011
Registro ICA Para Granos Almacenados	No.1375/ Octubre 2013
Concepto Toxicológico	MP-14368-2010
Nombre Químico	0-2 diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethyl phosphorothioate
Composición	500 gramos de i.a por litro de formulación 20°



Presentación:

Envases PET de 120ml y 1 Litro.

Seguridad y Precauciones

PIRLAX es un insecticida medianamente toxico (categoría toxicológica III) que exhibe un excelente margen de seguridad siempre y cuando se utilice de acuerdo a las indicaciones de manejo y aplicación estipuladas en su etiqueta, tales como:

- **Mantener el producto bien tapado** en su envase original, en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- **No fumar, comer ni beber** durante la manipulación del producto.
- **Evitar** el contacto con la piel y los ojos, evitar su inhalación.
- **No** dirigir la aspersión sobre personas, animales o alimentos.
- Para su aplicación **se debe** utilizar: Guantes, overol, botas, casco y mascarilla.



Rhizopherta dominica

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con abundante agua limpia durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón no utilice soluciones orgánicas.

En caso de ingestión, no inducir al vomito, acudir inmediatamente al médico.

En caso de inhalación, retirar el paciente a un lugar bien ventilado o al aire libre, mantenerlo en reposo.

PIRLAX es un insecticida líquido concentrado para fumigaciones por métodos de aspersión o nebulizaciones previa dilución en agua o en solventes orgánicos a las siguientes dosis:

TRATAMIENTO	DILUCIÓN	ÁREA A CUBRIR
Aspersión	10 a 20ml / 1lt de agua	25m2 / Litro
Nebulización	50ml / 1Lt de agua o solvente orgánico	1000 m3 / litro
Incorporación Al grano	18ml / 800ml de agua	1 Ton. (Protección 60 días)

ANTIDOTO: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático, no usar atropina ni antihistamínicos.

Categoría Toxicológica III medianamente toxico. En CASO DE INTOXICACIÓN, CONSULTAR AL MÉDICO PRESENTANDO LA ETIQUETA.

Teléfonos de emergencia:
Cisproquim: (057) 1 2886012, Colombia
Línea gratuita Nacional 01 8000 916 012
Servicio 24 Horas.



Tratamiento en Agroindustria

Características

PIRLAX tiene acción de contacto, ingestión e inhalación. Posee un efecto de larga duración, no afecta la germinación de las semillas tratadas y no produce ningún efecto sobre el sabor y olor que limite su uso.

Dosis y Aplicación

Posee un amplio espectro de acción, controlando distintas clases de insectos rastreros y voladores tales como: Gorgojos y polillas de los granos, hormigas, cucarachas, pulgas, moscas, escorpiones, arañas, ácaros, insectos que atacan las maderas (gorgojos, termitas, carcomas, etc.).

La dosis de Pirlax puede variar dependiendo del tipo de plaga que se va a controlar y del grado de infestación que se registre en el lugar (ver indicaciones en la siguiente página).



Uso en Salud Pública

Su ingrediente activo Pirimiphos Methyl constituye una exitosa alternativa para el control de insectos plaga, está avalado por la **FAO/OMS** para uso en el control de los principales vectores que afectan la salud pública, los granos almacenados, explotaciones pecuarias, bodegas, etc.

PIRLAX ofrece un efecto larvicida optimo para el control de larvas de insectos en criaderos (aguas estancadas, estercoleros, etc.).

TRATAMIENTO	DILUCIÓN	OBSERVACIONES
Aspersión directa sobre superficies para cubrir un área de 20m2.	25 a 50ml / 1Lt de agua	Para control de insectos voladores (moscas, mosquitos, zancudos) y rastreros (pulgas, cucarachas, arañas, hormigas, termitas, escorpiones).
Nebulizaciones en frío o caliente	50ml / 1Lt de solventes orgánicos	2Lt / Ha
Nebulización con maquina manual motomochila	250ml / Ha	1Lt / 20 viviendas

